



ファイト・シリーズ


使用ポイント

●アスパラ●

使用時期	使用方法	使用目的
萌芽前	<p>①萌芽前の土壌に対して ★ポイント!</p> <p>ファイト・メット 3000倍 + ファイト・カル 1000倍</p> <p>を混用で灌水処理 (10アールあたり200リットルが目安)</p>	萌芽促進 発根促進
ぎ葉展開時	<p>② ファイト・オーツ 1000倍液を葉面散布</p> <p>③10日後に ファイト・メット 150g (約3000倍)を灌水 ※液肥混入の要領で、500リットルの水に溶かして灌水</p> <p>④さらに10日後に ファイト・オーツ 1000倍液を1000倍液を葉面散布 ※アミノ酸系葉面散布剤との混用がより効果的です</p>	発根促進 地下茎肥大促進 養分貯蔵の充実

さらに...

- ※ぎ葉展開と収穫の並行の地域では、
・ **ファイト・オーツ** 1000倍液の葉面散布に重点をおいて使用
- ※高温期の芯止まり等の対策に、
・ **ファイト・カル** 500倍液を葉面散布(10~14日間隔で数回)



●収穫後、貯蔵養分蓄積期に

※収穫後の **エレマックス 0-28-26** 1000倍散布は、光合成と転流を促進し、貯蔵養分の蓄積を促し翌年の萌芽の充実に効果的です。



《使用上のお願い》
 【オーツ】、【カル】はほとんどの登録農薬との混用は可能です。
 ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、グリソキシムメチル剤、ボスカリド剤等)
 ※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
 ・散布はなるべく午前中に行なってください。