



# ファイト・シリーズ 使用ポイント

## ●ブロッコリ●

使用時期	使用方法	使用目的
育苗時	<p>① 本葉展開1.5葉期頃</p> <p><b>ファイト・オーツー</b> + <b>ファイト・カル</b> を各1000倍で7~10日おきに混用散布</p> <p>★購入苗または徒長苗の場合… 定植1~3日前に <b>ファイト・オーツー</b> + <b>ファイト・カル</b> を各1000倍で混用散布</p>	<p>徒長防止</p> <p>毛細根の充実</p> <p>活着促進</p>
定植後	<p>② 定植時に苗を <b>ファイト・オーツー</b> 1000倍液にどぶ漬け</p> <p>③ 外葉形成期の定植約10日後と約20日後に <b>ファイト・オーツー</b> + <b>ファイト・カル</b> を各1000倍で混用散布(農薬との混用可)</p> <p>④ 出蕾初期に <b>ファイト・オーツー</b> + <b>ファイト・カル</b> を各1000倍で1~2回混用散布(農薬との混用可)</p>	<p>活着促進</p> <p>外葉の充実</p> <p>病害抵抗性の向上</p>

### さらに…

※天候不順による生育不良や病気の恐れがある場合は…

**ファイト・オーツー** + **ファイト・カル**

を各1000倍で7~10日おきに2回混用散布

※栄養不良からくるべと病対策には…

**エレマックス 0-28-26** 1000倍液を

7日~10日おきに2~3回散布



### 《使用上のお願い》

- ・【オーツー】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。
- ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、グリソキシムメチル剤、フルジオキシニル剤、ボスカリド剤等)
- ※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
- ・散布はなるべく午前中に行なってください。



製造・販売元

株式会社ファイトクローム

〒102-0082

東京都千代田区一番町22-1セントラルビル5F TEL 03-3556-8720 FAX 03-3556-8721

[www.phyto.jp](http://www.phyto.jp)