



ファイト・シリーズ 使用ポイント

●メロン●

使用時期	使用方法	使用目的
育苗時	<p>① 本葉展開1.5葉期頃から</p> <p>ファイト・オーツ + ファイト・カル</p> <p>各1000倍液を混用で10日おきに2~3回散布</p> <p>★窒素過多からくる徒長防止には…</p> <p>エレマックス 0-28-26 500倍液を散布</p>	<p>移植時の 植傷み防止</p> <p>徒長防止</p> <p>毛細根の充実</p>
定植時	<p>② 定植後に ファイト・メット 2000倍液を 株元灌水</p> <p>③ 以降、着果枝開花頃まで</p> <p>ファイト・オーツ + ファイト・カル</p> <p>各1000倍液を混用で月2~3回葉面散布 (農薬混用可)</p> <p>★過繁茂で花が弱くなる(花トビ)恐れがある時に…</p> <p>エレマックス 0-28-26 500~1000倍液散布</p> <p>④ ファイト・メット を交配前に1回、 交配後に2回灌水(10日おき)</p> <p>* 反当り150gを水に溶かして液肥混入の要領で使用</p>	<p>しおれ防止</p> <p>活着促進</p> <p>花芽充実</p> <p>着果の安定</p> <p>玉伸び</p>

さらに…

- ★しおれ症状が出た時にはA,Bの順序で処理
A【オーツ】、【カル】各1000倍液を混用散布 B【メット】を反当り150g灌水処理
- ★交配後から【オーツ】、【カル】の各1000倍散布(10日おき)は、
糖度アップ、うるみ果防止に効果的です。

《使用上のお願い》

- ・【オーツ】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。
- ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、フルジオキシニル剤等)
- ※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
- ・散布はなるべく午前中に行なってください。