



# ファイト・シリーズ 使用ポイント

## ●大葉●

使用時期	使用方法	使用目的
育苗時	<p>① 本葉展開2葉期頃から</p> <p><b>ファイト・オーツ</b> + <b>ファイト・カル</b></p> <p>各1000倍液を混用で10日～14日おきに葉面散布            ※以降定植までに2～3回散布            ※セル苗・さし育苗に効果的です</p>	<p>健苗育成</p> <p>発根促進</p>
定植時	<p>② 定植時の苗に</p> <p><b>ファイト・メット</b> 2000倍液で灌水</p> <p>③ 定植後から約10日おきに</p> <p><b>ファイト・メット</b> を2～3回灌水</p> <p>※反当り150gを水に溶かし、液肥を使う要領で灌水します。            草丈がひざ下25cm以下までの時期に灌水して下さい。</p>	<p>活着促進</p> <p>しおれ予防</p>
	<p>④ 草丈が腰上以上の生育期に</p> <p><b>ファイト・オーツ</b> + <b>ファイト・カル</b></p> <p>各1000倍液を混用で10日おきに葉面散布</p> <p>※病虫害予防・発生の場合は、対象薬剤との混用散布が効果的です。</p>	<p>初期発根促進</p>

### さらに…

※軟化予防に・未消化窒素の軽減に…



**ファイト・オーツ** + **エレマックス 0-28-26**

各1000倍液を混用で10日おきに葉面散布

※葉の色・艶出しに、葉先枯れが発生したら…



**ファイト・カル** 500倍液で葉面散布



#### 《使用上のお願い》

- ・【オーツ】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。
- ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、ボスカリド剤等)
- ※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
- ・散布はなるべく午前中に行なってください。



製造・販売元  
株式会社ファイトクローム

〒162-0845  
東京都新宿区市谷本村町2-11 外濠スカイビル301 TEL 03-4316-4920 FAX 03-4316-4921

[www.phyto.jp](http://www.phyto.jp)