



ファイト・シリーズ 使用ポイント

●スイカ●

使用時期	使用方法	使用目的
育苗時	<p>① 接木2～3日前の穂木、台木に ファイト・オーツ + ファイト・カル 各1000倍液を混用で10日おきに2～3回散布</p> <p>② 以降定植まで(活着後)に、10日おきに2～3回散布 ※活着前に接木部に水分が触れると、芯止まりの原因になります。散布は接木前か活着後に行ってください。 ★窒素過多からくる徒長防止には… エレマックス 0-28-26 500倍液を散布</p>	<p>移植時の 植傷み防止</p> <p>徒長防止</p> <p>毛細根の充実</p>
定植時	<p>③ 定植後に ファイト・メット の2000倍液を株元灌水</p> <p>④ 定植～着果まで ファイト・オーツ + ファイト・カル 各1000倍液を混用で2～3回葉面散布 ★過繁茂で花が弱くなる(花トビ)恐れがある時に… エレマックス 0-28-26 500～1000倍液散布</p> <p>⑤ ファイト・オーツ + ファイト・カル を交配前に1回、交配後に2回葉面散布(10日おき) *灌水チューブが入っている場合には、散布の代わりに ファイト・メット を反当り150gを水に溶かして液肥混入の要領で使用</p>	<p>花芽充実</p> <p>着果の安定</p> <p>玉伸び</p> <p>樹勢低下防止</p>

さらに…

★しおれ症状が出た時にはA,Bの順序で処理

A:【オーツ】、【カル】各1000倍液を混用散布 B:【メット】を反当り150g灌水処理

★交配後から【オーツ】、【カル】の各1000倍散布(10日おき)は、糖度アップに効果的です。

《使用上のお願い》

・【オーツ】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。

※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、フルジオキシニル剤等)

※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。

・散布はなるべく午前中に行なってください。



製造・販売元

株式会社ファイトクローム

〒102-0082

東京都千代田区一番町22-1セントラルビル5F TEL 03-3556-8720 FAX 03-3556-8721

www.phyto.jp