



ファイト・シリーズ 使用ポイント

●ホウレンソウ・チンゲンサイ●
●コマツナ・タカナ・サラダ菜など●

使用時期	使用方法	使用目的
播種時	<p>① 本葉2枚展開後から</p> <p>ファイト・オーツ + ファイト・カル</p> <p>各1000倍液を7~10日おきに 1~2回混用散布</p>	<p>健苗育成</p> <p>発根促進</p> <p>徒長防止</p>
収穫期	<p>② 収穫7日前に</p> <p>ファイト・オーツ + エレマックス 0-28-26</p> <p>各1000倍液を混用散布</p>	<p>葉のツヤ出し</p> <p>葉肉の向上</p> <p>未消化窒素の軽減</p>

さらに...

★葉先枯れ予防に...

ファイト・カル 500倍液で葉面散布

※高温多湿時(夏場)の曇天・雨天時には予防として散布

★軟化予防に...

ファイト・オーツ + **エレマックス 0-28-26**

各1000倍液と対象薬剤との混用散布

※夏場の初期生育は、フザリウム・ピシウム等により腐れが発生しやすい状況です。殺菌剤と混用して、軟化を防ぎましょう。

【試験概要】

試験地: 横浜市内

供試作物: ホウレンソウ(レジーナ)

播種: 5月1日 収穫: 6月9日

・無処理区

・処理区: ファイト・オーツと
ファイト・カルを各1000倍で混用散布

1回目: 5月10日(子葉展開時)

2回目: 5月20日(本葉二枚展開時)



《使用上のお願い》

・【オーツ】、【カル】は殆んどの登録農薬との混用は可能です。

※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ

使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、フルジオキシニル剤、ボスカド剤等)

※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。

・散布はなるべく午前中に行なってください。



製造・販売元

株式会社ファイトクローム

〒102-0082

東京都千代田区一番町22-1セントラルビル5F TEL 03-3556-8720 FAX 03-3556-8721

www.phyto.jp