

収穫前の
雨が心配??

雨をはじく!という「新発想!!」

天然ワックス成分で作物をコーティング!

小麦

降雨の影響を受けやすい
春小麦、大麦には
特におすすめ!

穂発芽の軽減対策に!

使用時期

収穫前日～2週間前の
雨にあたりそうな時期




使用方法

1000倍
水で薄めて
散布



水が乾くと撥水
膜が出来、以降
の雨の浸透を
防ぎます

雨滴



[1000倍で葉面散布]

圃場試験

試験地区: 空知地区 / 散布: 収穫10日前を目安 (2011年事例)

品質・収量アップ


■フォーリングナンバーの減少
が少ない

■容積重が大きい傾向


■発芽指数が低い傾向

発芽指数は、採刈した小麦の穂を水に12時間強制的に浸漬し
た後選らせたロッキングワールの上に並べて2週間後に発芽数を調査
した。(各試験区6穂×3反復)


フォーリングナンバー



容積重(g/L)



発芽指数(%)



豆類

金時豆・手亡豆等

色流れの軽減対策に!

使用時期

収穫10日前のさやが
白くなってきた頃




使用方法

500倍
水で薄めて
散布



水が乾くと撥水
膜が出来、以降
の雨の浸透を
防ぎます

雨滴




[500倍で葉面散布]

圃場試験

試験地区: 十勝地方 / 散布: 9/17、収穫9/30 (2017年事例)

色流れが減り、等級もアップ!

	総重量	良 品		色流れ		製品率	総重量
	(g)	重量(g)	粒数	重量(g)	粒数	(%)	(g)
無処理区	1,490	1,260	1,102	230	298	84.6	4等
ACE処理区(500倍)	1,498	1,428	1,250	70	106	95.3	3等



収穫前の雨対策に 撥水材入り

- ストップACE(エース)
- 茨城県第2447号
- 内容成分: 天然カルナバワックス、界面活性剤、水溶性カルシウム
- ・生育旺盛期の散布は控える
- ・希釈液は全て使い切る
- ・散布後の薬剤等の散布は避ける
- ・希釈タンクは使用後すぐに洗う



1kg(1リットル)入り
4kg(4リットル)入り

株式会社 ファイトクローム www.phyto.jp

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-11 外濠スカイビルディング

TEL 03-4316-4920 FAX 03-4316-4921 MAIL info@phyto.jp

お求めはお近くの
JA・販売店へどうぞ

f ファイトクローム で検索!

ファイトクローム公式
チャンネル開設!

YouTube ファイトクローム

